

Diciembre 1, 2017

Estimado Padre de Familia y Personal:

Esto es para informar que ha habido casos de Pertussis (tos ferina) en **West High School**. Los síntomas de la tos ferina pueden incluir: Secreción nasal, fiebre y tos intensa que dura semanas o meses. Pertussis (tos ferina) se transmite por contacto directo con las secreciones respiratorias (estornudos, tos y secreción nasal) de una persona infectada. Para prevenir enfermedades y disminuir la propagación de esta enfermedad, sigue las pautas siguientes:

1. Cualquier persona con una tos u otros síntomas de resfriado debe contactar con su médico inmediatamente. Asegúrese de que el médico esté consciente de la exposición Pertussis (tos ferina).
2. Las personas que hayan sido completamente inmunizados antes en la vida todavía son susceptibles a la infección porque la vacuna para Pertussis (tos ferina) desaparece con el tiempo y ya no proporciona protección. Los bebés mayores de 6 semanas de edad necesitan la serie de vacunas DTaP para prevenir la Pertussis (tos ferina), pre-adolescentes de más de 10 años de edad, y los adolescentes y los adultos necesitan una vacuna Tdap para prevenir el tétanos, la difteria y la Pertussis (tos ferina). Comuníquese con su proveedor de atención médica o Salt Lake Valley Health Department en 385-468-7468 para hacer una cita para la vacuna.
3. Si usted o su hijo están inmunocomprometidos o tienen otros problemas médicos serios, por favor consulte con su médico de atención primaria para obtener recomendaciones.

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al proveedor de atención primaria o Salt Lake County Health Department en 385-468-4202. Gracias por su cooperación!

Atentamente,



Dagmar Vitek MD, M.P.H.
Médico
Salt Lake County Health Department